Ballreich/
Baumann

Grundlagen der Biomechanik des Sports Probleme · Methoden · Modelle

Herausgegeben von Rainer Ballreich
und Wolfgang Baumann

Das Werk führt systematisch und leicht verständlich in Probleme, Methoden und Modelle der Biomechanik des Sports ein. Einer detaillierten Beschreibung verschiedenartiger Untersuchungsziele wie Leistungsoptimierung und Belastungsgestaltung folgt eine informative und anwendungsorientierte Bearbeitung biomechanischer Meßgrößen und Meßverfahren. Den Abschluß bildet die nach einem einheitlichen Schema aufbereitete Darstellung von Modellen der sportmotorischen Technik, der mechanischen Belastung des Bewegungsapparats und der Massenträgheitscharakteristika von Körpersegmenten.

Grundlagen der Biomechanik
des Sports

111 Abbildungen, 68 Tabellen

Enke

Enke

5 Untersuchungsmethodische Aspekte der Biomechanik des Sports

Rainer Ballreich

Die thematische Formulierung dieses Abschnitts verdeutlicht, daß im Rahmen einer solchen Darstellung keine systematische Aufbereitung unterschieden methodischer Bedingungen zu erwarten ist, sondern nur einige – nach Ansicht des Autors für die Biomechanik jedoch zentral – unterschiedsmethodische Probleme behandelt werden. Diese beziehen sich zum einen auf Versuchsanordnungen zur Identifikation biomechanischer Einflußgrößen der sportmotorischen Leistung bzw. des sportmotorischen Leistungsstands und zum anderen auf die Güteeigenschaften biomechanischer Einflußgrößen.

5.1 Versuchsanordnungen zur Identifikation biomechanischer Einflußgrößen der sportmotorischen Leistungsstands

5.1.1 Zum Begriff „Biomechanische Einflußgröße der sportmotorischen Leistung“

Als biomechanische Einflußgrößen der sportmotorischen Leistung bzw. des sportmotorischen Leistungsstands bezeichnen wir biokinetische und biodynamische Merkmale sowohl des Bewegungsablaufs als auch von Struktur und Material des Bewegungsapparats, deren Variation (Änderung) eine Kovariation (Mißänderung) der sportmotorischen Leistungshöhe in einer Sportart bzw. -disziplin bedingt. Hierbei kann eine gleichsinnige oder gegensinnige Kovariation der sportmotorischen Leistungshöhe mit dem Betrag (Intensität) der biomechanischen Einflußgröße vorliegen, wobei die Kovariation auf eine bestimmte Sportart bzw. -disziplin, auf eine bestimmte Leistungshöhe mit definierter unterer und oberer Grenze, auf eine bestimmte Geschlechtszugehörigkeit sowie auf ein bestimmtes Alter zu beziehen ist.

5.1.2 Zum Begriff „Biomechanisches Experiment“

Experimente in der Biomechanik des Sports orientieren sich an einem eindeutig definierten, relativ engen Umfang des Begriffes „Experiment“ (Klauer 1973, Selg und Bauer 1971, Wormser 1974).

Biomechanisches Experiment: Planmäßig vorbereiteter und absichtlich ausgeloster Vorgang mit dem Ziel, den Einfluß der Variation einer oder mehrerer potentieller biomechanischer Einflußgrößen (unabhängige Variable UV) auf die biomechanische Zielgröße (abhängige Variable AV) objektiv festzustellen unter Konstanthaltung bzw. Kontrolle jener Variablen (Störvariable SV), die die Zielgröße mitbeeinflussen können. Im folgenden erläutern wir die definitorischen Bezeichnungen „unabhängige Variable“, „abhängige Variable“ und „Störvariable“.

Unabhängige Variable (UV): gegenüber anderen Einflußgrößen isoliert variierte potentielle Einflußgröße, deren Einfluß auf die → abhängige Variable objektiv festgestellt werden soll.
Abhängige Variable (AV): Zielgröße, deren Änderung infolge der Variation potentieller Einflußgrößen (unabhängige Variable) objektiv festgestellt werden soll.
Störvariable (SV): Einflußgröße (der abhängigen Variablen), die im Unterschied zur unabhängigen Variablen plangemäß nicht variiert, sondern konstant gehalten bzw. hinsichtlich ihrer Schwankungsbreite (→ Grad der Reproduzierbarkeit) kontrolliert wird.

5.1.3 Experimentelle biomechanische Versuchsanordnungen

Aus unterschiedsmethodischen Erwägungen erscheint es zweckmäßig, zwischen einer experimentellen und einer quasi-experimentellen Fragestellung bzw. Versuchsanordnung zu unterscheiden.

Unter dem Aspekt einer Optimierung sportmotorischer Leistungen lautet die zentrale experi-

mentelle biomechanische Fragestellung: Welche Änderung der sportmotorischen Leistungshöhe bewirkt die Variation des oder der unterschiedsrelevanten biomechanischen Merkmale (→ unabhängige Variable)?

Die Beantwortung dieser Frage setzt eine Versuchsanordnung voraus, in der die unterschiedsrelevanten biomechanischen Merkmale unter Konstanthaltung bzw. Kontrolle von Störvariablen variiert und ihr Einfluß auf die sportmotorische Leistungshöhe objektiv, d. h. unabhängig vom Untersucher (Experimentator) festgestellt werden kann.

Zur Variation der unabhängigen biomechanischen Variablen: Die (inter- bzw. intraindividuelle) Variation unabhängiger Variablen ist zumindest auf eine zweifache Weise möglich: 1. durch in ihrer Ausföhrung kontrollierbare trainingsmethodische Maßnahmen zur Variation der unterschiedsrelevanten biomechanischen Merkmale auf dem momentan vorgegebenen sportmotorischen Leistungsstand (Querschnittuntersuchung); 2. durch Änderung der unterschiedsrelevanten biomechanischen Merkmale während eines Trainingsabschnitts (Längsschnittuntersuchung) mit Hilfe einer gezielten Steuerung.

Im Zusammenhang mit der experimentellen Fragestellung ist problematisch, ob und inwieweit mit Hilfe von trainingsmethodischen Maßnahmen eine isolierte Variable biomechanischer Merkmale möglich ist. In der Regel werden solche Maßnahmen, außer den unterschiedsrelevanten Merkmalen, die Kovariation eines weiteren Merkmalskomplexes bewirken, so daß die kausale Interpretation (Ursachendeutung) zumindest erschwert ist.

Die Kovariation ist darauf zurückzuführen, daß biomechanische Merkmale sog. organismische Variable sind, die dem untersuchten Organismus anhaften. „Organismische Variable ... sind immer konfundiert, sie hängen immer mit anderen Variablen im Organismus zusammen, wer weiß mit welchen“ (Wormser 1974). So sind beispielsweise Beschleunigungswege stets mit Gelenkwinkelwegen konfundiert und die Zykluslänge mit der Zyklusfrequenz oder der Beschleunigungskraftstoß mit dem Bremskraftstoß. Ähnliche Überlegungen können in bezug auf die „Ansteuerung unterschiedsrelevanter biomechanischer Merkmale“ angestellt werden. Auch hier ist die „gezielte Ansteuerung“ biomechanischer Merkmale fraglich. Während eines biomechanisch gestützten Trainings der Diskuswurftechnik führte die angesteuerte Abnahme der Umspinnungspha-

sendauer zu einer unbeabsichtigten und leistungsnegativen Zunahme der einstützigen Übergangsphasendauer (Abb. 2.20).

Die Problematik jeder experimentellen Anordnung und damit auch der biomechanischen liegt in der Zulässigkeit des experimentellen Schlusses, d. h. darin, ob das mit Hilfe einer solchen Anordnung identifizierte biomechanische Merkmal tatsächlich als kausale (verursachende) Einflußgröße wirksam ist oder ein Merkmal bzw. ein Merkmalskomplex (u. a. Sprungbeispiel), das bzw. der mit dieser Größe zusammenhängt (konfundiert).

Experimente führen ausschließlich zu Wenn-dann-Beziehungen, wie bspw.: Wenn bei Vertikalsprüngen der vertikale Beschleunigungspegel variiert wird, dann ändert sich (kovariert) die vertikale Abfluggeschwindigkeit mit. Da zumindest bei organismischen Variablen nicht auszuschließen ist, daß die kausale(n) Einflußgröße(n) im Experiment nicht direkt erfäßt worden ist (sind), sondern nur indirekt, indem sie mit dem experimentell variierten Merkmal kovariert (kovariieren), dürfen „experimentell nachgewiesene Kovariationen nicht einfach kausal erklärt werden“ (Klauer 1973). So sind im o. a. Beispiel (biomechanisch verursachende Einflußgrößen der vertikalen Abfluggeschwindigkeit) die Dauer und der Betrag der mittleren vertikalen Beschleunigungskraft sowie die Masse der springenden Versuchsperson, wobei der vertikale Beschleunigungsweg mit diesen Einflußgrößen kovariiert.

Trainingspragmatische Erwägungen relativieren dieses Problem jedoch dahingehend, daß das primäre Ziel „die angesteuerte Änderung der sportmotorischen Leistungshöhe“ dann unabhängig davon ist, ob dieses Ziel durch die identifizierbare Einflußgröße oder durch mit ihr konfundierte Merkmale bewirkt wird, wenn zieleffektive (einflußgrößenorientierte) Ansteuerungsprogramme verfügbar sind.

Zur Konstanthaltung bzw. Kontrolle von Störvariablen:

Ein weiteres Argument gegen die Zulässigkeit des experimentellen Schlusses im Sinne einer kausalen Identifikation biomechanischer Einflußgrößen der sportmotorischen Leistung bzw. des sportmotorischen Leistungsstands bezieht sich darauf, daß die biomechanischen – wie andere biometrische Beobachtungsgrößen – durch Einfluß sind. Infolge dieser Einflüsse, d. h. Störvariablen (u. a. Variabilität der „Versuchsobjekte“ bzw. des Beobachtungsmaterials sowie der Versuchs- und Beobachtungsbedingungen“, die man

nicht konstant halten kann (u. a. die sportmotorische Leistungsbereitschaft, Ermüdungsgrad) bzw. aus durchführungsökonomischen Erwägungen im Zusammenhang mit „fehlenden“ Wettkampfbestimmungen nicht konstant halten will (u. a. klimatische Faktoren bei Freiluftwettkämpfen, Kunststoffbahnen für Alpinen oder Nordischen Skilauf), wird die biomechanische Zielgröße (sportmotorische Leistung bzw. sportmotorischer Leistungszustand) zu einer Zufallsgröße, d. h. einer „Größe, die unter gegebenen Bedingungen einmal diesen, einmal einen anderen Wert annimmt“ (Sachs 1973)].

Die Existenz solcher Störvariablen erschwert zusätzlich die kausale Identifikation biomechanischer Einflußgrößen der sportmotorischen Leistung bzw. des sportmotorischen Leistungsstands.

5.1.4 Quasi-experimentelle biomechanische Versuchsarrangierungen

Im Unterschied zur experimentellen Anordnung, in der mit Hilfe einer (inter- bzw. intraindividuellen) Variation biomechanischer Bedingungen der sportmotorischen Leistung (bzw. des sportmotorischen Leistungsstands) deren Einfluß auf die Leistungsgröße untersucht wird, variiert man bei der quasi-experimentellen Anordnung nicht Bedingungen der Leistung, sondern man bedient sich der vorgegebenen – nach Leistungsgröße und Leistungsbedeutung ausgewählten – Varietät der sportmotorischen Leistung. Zur Identifikation biomechanischer Einflußgrößen der sportmotorischen Leistung zieht man sowohl die Kovariation (varianz-, korrelations-, faktorenanalytische Prüfverfahren) sowie die Aufeinanderfolge (Sukzession) von Einflußgröße (UV) und Zielgröße (AV) als auch (bio-)mechanische Gesetzmäßigkeiten heran (vgl. 6.4.2).

Unter dem Aspekt der Leistungssteuerung lautet die zentrale quasi-experimentelle biomechanische Fragestellung: Welcher Anteil an der Variation der sportmotorischen Leistungsgröße kommt den untersuchungsrelevanten biomechanischen Merkmalen zu? Die Beantwortung dieser Frage setzt eine Versuchsarrangierung voraus, in der die sportmotorische Leistungsgröße variiert. Eine solche Variation ist intra- und interindividuell möglich:

1. durch intraindividuelle Variation im (sub-)maximalen Leistungsbereich, d. h. durch unterschiedliche intraindividuelle sportmotorische Leistungsstufen (intraindividuelle Leistungsvariation);

2. durch Auswahl einer oder mehrerer Personstichproben, deren Versuchspersonen unterschiedliche sportmotorische Leistungsstufen aufweisen (interindividuelle Leistungsverteilung).

Die Problematik der quasi-experimentellen Anordnung liegt in dem gegenüber der experimentellen Anordnung geringeren Grad der Zuverlässigkeit des experimentellen Schlusses, d. h. darin, daß die mit Hilfe einer solchen Anordnung identifizierten biomechanischen Merkmale nicht in jedem Falle als kausale Einflußgrößen wirksam sind. Eine experimentelle Kontrolle quasi-experimentell identifizierter Einflußgrößen ist daher im allgemeinen notwendig, um die Zuverlässigkeit des Schlusses zu verfestigen, wonach die Änderung der sportmotorischen Leistungsgröße durch die identifizierten biomechanischen Einflußgrößen zustande kam.

5.2 Zu den Güteeigenschaften biomechanischer Einflußgrößen

Im Zusammenhang mit der Bestimmung biomechanischer Einflußgrößen der sportmotorischen Leistung bzw. des sportmotorischen Leistungsstands ist die „Exaktheit“ neben der „Versuchsanordnung“ ein weiteres Bestimmungselement. Die Exaktheit orientiert sich an den Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität.

Diese Exaktheitskriterien beziehen wir auf die Methoden der Datengewinnung (Meßwertstellung) biomechanischer Beschreibungsgrößen bzw. Einflußgrößen und auf diese Größen selbst. Unter der *Objektivität* eines Verfahrens verstehen wir den Grad, in dem die Ergebnisse dieses Verfahrens unabhängig vom Untersucher sind. Der Bedeutungsüberschub des Begriffs Objektivität wird unter Berücksichtigung des wissenschaftstheoretischen Kriteriums der intersubjektiven Prüfbarkeit durch die inhaltliche Festlegung auf „interpersonelle Übereinstimmung der Untersucher“ eingegrenzt. Da dieser Grad der Unabhängigkeit bzw. Objektivität u. a. vom quantitativen Informationsgehalt der zu untersuchenden biomechanischen Beschreibungsgrößen und von der Genauigkeit der biomechanischen Meßgeräte abhängt, weisen biomechanische Meßergebnisse im allgemeinen einen hohen Grad an Durchführungs- und Auswertungs-)Objektivität auf.

In Verbindung mit dem Aspekt der Gleichzeitigkeit von sportmotorischem Leistungsvollzug und der Meßwertstellung biomechanischer Beschreibungsgrößen bzw. Einflußgrößen stellt sich das Problem der *Reliabilität* oder *Zuverlässigkeit*

dieser Größen. Arbeitshypothetisch bezeichnen wir eine Größe dann als reliabel, wenn ihr Betrag (ihre Intensität) unter denselben kontrollierten Bedingungen eine möglichst kleine Variationsbreite aufweist, kurz, wenn diese Größe reproduzierbar ist. Die Reproduzierbarkeit ist bei einem gleichzeitigen Akt von sportmotorischem Leistungsvollzug und Meßwertstellung ohne Bedeutung für das Kriterium der Exaktheit, denn in diesem Fall liegt eine eindeutige zeitlich aufeinanderfolgende Zuordnung von Betrag (Intensität) der Beschreibungs- bzw. Einflußgröße und sportmotorischer Leistungsgröße vor. Ein anderer Beitrag der Größe bedingt – sofern diese Beschreibungsgröße als Einflußgröße wirksam ist – auch eine andere sportmotorische Leistungsgröße. Wenn ein nicht gleichzeitiger Akt von sportmotorischem Leistungsvollzug und Meßwertstellung vorliegt, dann ist für das Verfahren der Simulation der sportmotorischen Leistung – u. a. im biomechanischen Test – die Reproduzierbarkeit der jeweiligen Beschreibungsgröße eine notwendige Bedingung für den empirischen Gehalt der experimentellen Aussage.

Ein letztes Exaktheitskriterium betrifft die sogenannte *Validität* oder *Gültigkeit*. In die Gültigkeitskategorie gehören u. a. der Grad an diagnostischer Eindeutigkeit (Bestimmungsgenauigkeit) des momentanen sportmotorischen Leistungsstands bzw. der Grad an prognostischer Treffsicherheit (Vorhersagegenauigkeit) der zu erwartenden sportmotorischen Leistungsgröße auf der Grundlage von biomechanischen Einflußgrößen, die mit Hilfe von Tests überprüft wurden. Hierbei geht es um die Vorhersage eines Verhaltens (Kriteriumsverhalten), das außerhalb der Testsituation liegt, wobei die Vorhersage das Ergebnis eines induktiven Prozesses (Schließen vom Testverhalten auf das Kriteriumsverhalten) darstellt. Es ist evident, daß der Grad der vorhersagenden Treffsicherheit gleichsam variiert mit der Engverhältnis des Zusammenhangs zwischen dem Kriteriumsverhalten (Indikator: sportmotorische Leistungsgröße) und dem Testverhalten (Indikator: Betrag der Einflußgröße bzw. -größen). Aus der Forderung nach einem hohen Grad an diagnostischer Eindeutigkeit und vorhersagender Treffsicherheit resultiert die Forderung nach validen biomechanischen Tests zur Erfassung des sportmotorischen Leistungsstands bzw. zur Vorhersage der sportmotorischen Leistungsgröße. Am Beispiel der Sprungkraftmessung erläutern wir in Abschnitt 2.2.4 ausführlich die diagnostische Eindeutigkeit biomechanischer gegenüber der diagnostischen

Mehrdeutigkeit sportmotorischer Tests. Die Sprungkraft kann zumindest durch drei (bio-)mechanische Leistungsindikatoren bestimmt werden, die auf verschiedenen diagnostischen Verfahren beruhen (zwei sportmotorische Tests: „Jump-and-reach-Test“ sowie „Sprunggrüteltest“ und ein biomechanischer Test: „Dynamometrischer Test“). Ordnet man diese Tests bzw. Indikatoren nach dem Exaktheitsgrad bzw. der diagnostischen Eindeutigkeit (Validität) der Sprungkraftmessung, dann steht der biomechanische Test an erster Stelle (Indikator der Sprungkraft: vertikaler Flugweg des KSP), der Sprunggrüteltest (Indikator der Sprungkraft: Flugweg eines Hüftpunkts) an zweiter und der Jump-and-reach-Test (Indikator der Sprungkraft: Differenz zwischen Sprung- und Reichhöhe) an dritter Stelle (Marhold 1963, Nigg 1974). Nach den Ergebnissen von Marhold (Nigg) überschätzt der Jump-and-reach-Test infolge seiner Abhängigkeit von motorischen Eigenschaften und Fähigkeiten wie Gelenkigkeit, Dehnfähigkeit und optimalem Timing zwischen der Tipfbewegung der Hand und der Umkehrbewegung des Körpers im Fluge die Sprungkraft gegenüber dem biomechanischen Test um durchschnittlich 0,20 m (0,16 m). Im Falle des Sprunggrüteltests bewirken schwerwiegendere, standdifferenzierende individuelle Bewegungsausführungen eine Vergrößerung der am Bandmaß ablesbaren Sprunghöhe bis zu ca. 0,05 m. Je nachdem, welches dieser Verfahren man für die Bestimmung der Sprungkraft heranzieht, erhält man unterschiedlich exakte bzw. valide Angaben über die Größe der Sprungkraft. Der Vorteil des biomechanischen Tests an diagnostischer Eindeutigkeit (Validität) und Exaktheit gegenüber dem sportmotorischen Test wird durch den Nachteil eines relativ hohen technisch-apparativen Aufwands erkauft.

5.3 Literatur

- Klauer, K. J.: Das Experiment in der pädagogischen Forschung. Düsseldorf 1973
- Marhold, G.: Biomechanische Untersuchungen sportlicher Hochsprünge. Diss., Leipzig 1963
- Nigg, B. M.: Sprung, Sprünge, Sprünge. Zürich 1974
- Sachs, L.: Angewandte Statistik. Berlin 1973
- Selig, H., W. Bauer: Forschungsmethoden der Psychologie. Stuttgart-Berlin-Köln-Mann 1971
- Wormser, R.: Experimentelle Psychologie. München 1974