



WUNDVERSORGUNG UND VERBÄNDE

H F RETTUNGSSANITÄTER*IN
27.05.2021

JUNIA LANDTWING & VICTORIA HELD



ABLAUF LEKTION

- Begrüssung / Fragen Flipped Classroom
- Arbeitsblatt Wundversorgung
- Input Referat Verbände
- Postenlauf Verbandstypen
- Ausblick




FLIPPED CLASSROOM?

ETH zürich
Moodle

Fachdidaktik Gesundheitswissenschaften und Technologie 1 und 2 - 2020/2021

Dashboard / Kurse / ETH / D-HEST / Autumn Semester 2020 / Fachdidaktik Gesundheitswissenschaften und Technologie 1 und 2 - 2020/2021 / Abschnitte / FD2 LV12: Lektionen halten / Quiz Wundversorgung und Verbände

Quiz Wundversorgung und Verbände





PLATZWUNDE

Wo ist eine Platzwunde eher unwahrscheinlich?

- Schienbein
- Gesicht ⚡
- Bauch



Gesicht = Vorderfläche des Kopfes, welche im wesentlichen die Gesichtsmerkmale **Mund, Nase** und **Augen** umfasst. => eher unwahrscheinlich

=> An der Stirn ist eine Platzwunde möglich.








AB WUNDVERSORGUNG

- Dossier Seite 6
- AB Wundversorgung
 - Wundart
 - Erste Hilfe








Wundversorgung					
Wundart					
Entstehung	Kratzer, leichte Ablederungen der Haut	Einwirkung durch stumpfe, reissende Gewalt		scharfe, glatte Gegenstände	Messer, spitze Gegenstände, etc.)
Symptome	Blutende und nässende Hautabschürfung, Schmerzen, häufig verschmutzt	Offene, blutende Wunde mit unregelmässigen Wundrändern, Taschenbildung Schmerzen, häufig verschmutzt, Infektionsgefahr ist bei Risswunden gross.		Glatte, manchmal klaffende Wunden, die stark bluten. Mässige Schmerzen	Glatte, tiefe Wunden. Nach aussen geringe Blutung. Die Gefahr der inneren Blutung, je nach Ort der Verletzung, ist hoch. Grosse Infektionsgefahr.
Erste Hilfe					
Verbandsart					
Notizen					



					
Wundart					
Entstehung	Kratzer, leichte Abloderungen der Haut	Einwirkung durch stumpfe, reissende Gewalt		scharfe, glatte Gegenstände	Messer, spitze Gegenstände, etc.)
Symptome	Blutende und nässende Hautabschürfung, Schmerzen, häufig verschmutzt	Offene, blutende Wunde mit unregelmässigen Wundrändern, Taschenbildung Schmerzen, häufig verschmutzt, Infektionsgefahr ist bei Risswunden gross.		Glatte, manchmal klaffende Wunden, die stark bluten. Mässige Schmerzen	Glatte, tiefe Wunden. Nach aussen geringe Blutung. Die Gefahr der inneren Blutung, je nach Ort der Verletzung, ist hoch. Grosse Infektionsgefahr.
Erste Hilfe					
Verbandsart					
Notizen					





					
Wundart	Schürfwunde	Quetschwunde	Risswunde	Schnittwunde	Stichwunden
Entstehung	Kratzer, leichte Ablösungen der Haut	Einwirkung durch stumpfe, reissende Gewalt		scharfe, glatte Gegenstände	Messer, spitze Gegenstände, etc.)
Symptome	Blutende und nässende Hautabschürfung, Schmerzen, häufig verschmutzt	Offene, blutende Wunde mit unregelmässigen Wundrändern, Taschenbildung Schmerzen, häufig verschmutzt, Infektionsgefahr ist bei Risswunden gross.		Glatte, manchmal klaffende Wunden, die stark bluten. Mässige Schmerzen	Glatte, tiefe Wunden. Nach aussen geringe Blutung. Die Gefahr der inneren Blutung, je nach Ort der Verletzung, ist hoch. Grosse Infektionsgefahr.
Erste Hilfe	- Reinigung - Desinfektion, - Wundversorgung	- Reinigung - Desinfektion - Wundversorgung - Infektionsschutz		Stark blutende oder tiefe Wunden (klaffend) - ärztliche Behandlung Kleinere Wunden: - Reinigung - Desinfektion - Wundversorgung - Infektionsschutz	- Gegenstände in der Wunde lassen und abpolstern. - Wunde nicht desinfizieren, sondern steril abdecken. - Ärztliche Behandlung.
Verbandsart	-----	-----		-----	
Notizen					



VERBANDSARTEN







DECKVERBAND

Zweck: Schutz der Wund

- vor Verunreinigung
- vor Hitze, Kälte und anderen Witterungseinflüssen
- vor mechanischer Schädigung (Berühren, Kleider)



Tuchverband (Abdeckung / Transport)



Bindenverband (Stunden belassen)




DRUCKVERBAND

Zweck: Blutstillung durch starken örtlichen Druck

- übernimmt bis zur Heilung der Wunde teils die Funktion der Haut

Druckpolster, Kompressen, Gazebinde, Elastische Binde





ALLGEMEIN

- Verband trocken und rutschfest anlegen
- Teile mit unmittelbarem Kontakt zur Wunde sauber Kompressen auf Seite des Wundkontakts nicht berühren Kompressen über Wundränder hinausragen
- Verband über Kompressen hinausreichen
- Falls Kompressen zu klein (grossflächige Verbrennung) Abdeckmaterial möglichst sauber



P A T I E N T E N H A N D L I N G

- Patient*in in günstige Lage bringen
- Verletztes Körperteil stützen - möglichste schonende Anbringung des Verbands in Ruhe
- Keine unnötigen und hastigen Bewegungen




TIPPS & TRICKS





TIPPS & TRICKS


- Aufgerollter Teil der Binde liegt oben
- Kontrollierte Bindenführung
- Dichtes Abrollen am Körperteil
- Dosierung der Druckstärke





TIPPS & TRICKS


- Richtung links nach rechts & distal nach proximal (herzwärts)
- Kein Verrutschen oder Einschnüren
- Kreistour am Anfang verdeckt jede vorhergehende (Verankerung)
- Freies Bindenende schräg, Ecke einschlagen nach erster Tour, Fixierung zweite Tour





TIPPS & TRICKS

- Schraubengang zur Verbindung grösserer Körperabschnitte
- Einzelne Touren überdecken sich zur Hälfte bis zwei Drittel, Ränder parallel
- Elastisches Bindematerial auch bei stark konischen Körperpartien gut möglich





POSTENLAUF

- 3 Gruppen
- AB Wundversorgung
 - Verbandsart
- 3 x 5 min
- Patientenhandling!








Wundversorgung

Wundart					
Entstehung	Kratzer, leichte Abderungen der Haut	Einwirkung durch stumpfe, reissende Gewalt		scharfe, glatte Gegenstände	Messer, spitze Gegenstände, etc.)
Symptome	Blutende und nässende Hautabschürfung, Schmerzen, häufig verschmutzt	Offene, blutende Wunde mit unregelmässigen Wundrändern, Taschenbildung Schmerzen, häufig verschmutzt, Infektionsgefahr ist bei Risswunden gross.		Glatte, manchmal klaffende Wunden, die stark bluten. Mässige Schmerzen	Glatte, tiefe Wunden. Nach aussen geringe Blutung. Die Gefahr der inneren Blutung, je nach Ort der Verletzung, ist hoch. Grosse Infektionsgefahr.
Erste Hilfe					
Verbandsart					
Notizen					









					
Wundart	Schürfwunde	Quetschwunde	Risswunde	Schnittwunde	Stichwunden
Entstehung	Kratzer, leichte Abderungen der Haut	Einwirkung durch stumpfe, reissende Gewalt			Messer, spitze Gegenstände, etc.)
Symptome	Blutende und nässende Hautabschürfung, Schmerzen, häufig verschmutzt	Offene, blutende Wunde mit unregelmässigen Wundrändern, Taschenbildung Schmerzen, häufig verschmutzt, Infektionsgefahr ist bei Risswunden gross.			Glatte, tiefe Wunden. Nach aussen geringe Blutung. Die Gefahr der inneren Blutung, je nach Ort der Verletzung, ist hoch. Grosse Infektionsgefahr.
Erste Hilfe	- Reinigung - Desinfektion, - Wundversorgung	- Reinigung - Desinfektion - Wundversorgung - Infektionsschutz			- Gegenstände in der Wunde lassen und abpolstern. - Wunde nicht desinfizieren, sondern steril abdecken. - Ärztliche Behandlung.
Verbandsart					
Notizen					





					
Wundart	Schürfwunde	Quetschwunde	Risswunde	Schnittwunde	Stichwunden
Entstehung	Kratzer, leichte Abderungen der Haut	Einwirkung durch stumpfe, reissende Gewalt		scharfe, glatte Gegenstände	Messer, spitze Gegenstände, etc.)
Symptome	Blutende und nässende Hautabschürfung, Schmerzen, häufig verschmutzt	Offene, blutende Wunde mit unregelmässigen Wundrändern, Taschenbildung Schmerzen, häufig verschmutzt, Infektionsgefahr ist bei Risswunden gross.		Glatte, manchmal klaffende Wunden, die stark bluten. Mässige Schmerzen	Glatte, tiefe Wunden. Nach aussen geringe Blutung. Die Gefahr der inneren Blutung, je nach Ort der Verletzung, ist hoch. Grosse Infektionsgefahr.
Erste Hilfe	- Reinigung - Desinfektion, - Wundversorgung	- Reinigung - Desinfektion - Wundversorgung - Infektionsschutz		Stark blutende oder tiefe Wunden (klaffend) - ärztliche Behandlung Kleinere Wunden: - Reinigung - Desinfektion - Wundversorgung - Infektionsschutz	- Gegenstände in der Wunde lassen und abpolstern. - Wunde nicht desinfizieren, sondern steril abdecken. - Ärztliche Behandlung.
Verbandsart	Deckverband	Deckverband		Druckverband	
Notizen					





DANKE FÜR DIE GUTE
MITARBEIT!

