

Schriftliche Prüfung: In Notfallsituationen situationsgerecht reagieren

Name:	
Prüfungsdatum:	
Klasse:	

Erreichte Punktzahl:	Max. Punktzahl:	Note:
	13.5	
Kommentar:		

Epileptischer Krampfanfall	Erreichte Punktzahl	Max. Punktzahl												
Aufgabe 1: Beantworten sie folgende Fragen zum Thema epileptischer Krampfanfall mit richtig oder falsch (Kreuz setzen). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Behauptung</th> <th>richtig</th> <th>falsch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In der Regel begrenzt epileptische Aktivität sich selbst und der Anfall hört von alleine nach 2-3 Minuten wieder auf.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Es wird unterschieden zwischen einer echten Epilepsie und einer falschen Epilepsie.</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Der status epilepticus kann lebensbedrohlich sein.</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Aufgabe 2: Bringen sie die nachfolgenden Begriffe in die richtige Reihenfolge: Vor Verletzungen schützen z.B. Stuhl wegstellen L Dauert der Anfall länger als 3 Min. einen Arzt rufen R Nach dem Anfall in stabile Seitenlage bringen K Gegebenenfalls jemanden um Hilfe bitten E Kopf weich lagern z.B. Jacke unter den Kopf legen L Nach dem Anfall: ausruhen lassen L Ruhig bleiben Betroffenen nicht alleine lassen A In Ruhe abwarten S Auch nach dem Anfall: nicht alleine lassen A Lösungswort: <u>__ALLESKLAR__</u>	Behauptung	richtig	falsch	In der Regel begrenzt epileptische Aktivität sich selbst und der Anfall hört von alleine nach 2-3 Minuten wieder auf.	X		Es wird unterschieden zwischen einer echten Epilepsie und einer falschen Epilepsie.		X	Der status epilepticus kann lebensbedrohlich sein.	X		3	3
Behauptung	richtig	falsch												
In der Regel begrenzt epileptische Aktivität sich selbst und der Anfall hört von alleine nach 2-3 Minuten wieder auf.	X													
Es wird unterschieden zwischen einer echten Epilepsie und einer falschen Epilepsie.		X												
Der status epilepticus kann lebensbedrohlich sein.	X													
	4.5	4.5												
Hypoglykämie Aufgabe 3: Fallbeispiel: Herr Schneider leidet unter Diabetes Typ II. Er wurde in der Klinik Schritt für Schritt zur selbständigen Durchführung der Blutzuckermessung, der Einschätzung der Werte und der Insulininjektion angeleitet.														

Was für Symptome könnte Herr Schneider aufzeigen, wenn er vergisst Insulin zu spritzen? (Nenne mindestens zwei) ➔ Durst, häufiges Wasserlassen, Müdigkeit, Schwindel, Juckreiz, Hungerattacken, Hyperglykämie, diabetisches Koma	2	2
Was könnte passieren, wenn Herr Schneider nach der Insulininjektion zu lange wartet mit dem Essen der Mahlzeit? (1 Satz) ➔ Schwitzen, Zittern, Kribbeln in Fingern und Lippen, Angstgefühle, Hungergefühle, Heisshunger	1	1
Was können sie als angehende FaGe machen, wenn sie bemerken, dass Herr Schneider unter einer Hypoglykämie leidet? (Nenne drei Massnahmen) ➔ Im Notfall: Rettungsdienst alarmieren ➔ Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage bringen ➔ Sonst: Glukose verabreichen	3	3
Punktetotal	13.5	13.5