

Schlaganfall

Ladina Wohlwend

Einstieg Fallbeispiel





Ich erkenne
Anzeichen für
einen
Schlaganfall!




Risikofaktoren:
Erhöhter Blutdruck

TIA:
Symptome, welche weniger
wie 24h angehalten haben.

Symptome:
Taubheitsgefühl im Arm;
Bewusstlosigkeit

**Wie sieht nun eigentlich
die Behandlung aus?**

**Was ist meine Aufgabe
nach der akuten Phase
des Schlaganfalls?**




**Was muss ich in der
akuten Pflege beachten?**

Unsere heutigen Lernziele

- Ich kann in einem Fallbeispiel die Behandlung nach einem Schlaganfall nachvollziehen.
- Ich kann in einem Fallbeispiel erklären, was ich bei der akuten Pflege des Patienten/der Patientin beachten muss.
- Ich kann in einem Fallbeispiel erklären, was ich bei der subakuten Pflege des Patienten/der Patientin beachten muss.


Wo befinden wir uns?



Ablauf der heutigen Lektion


- Einstieg in Lektion mit Fallbeispiel
- Theorieinput: Wie kann geholfen werden?
- Fortsetzung Fallbeispiel
- Gruppenpuzzle: Was tut die Pflege nach dem Verschluss von Hirnarterien?
- Abschluss

Wie sieht nun eigentlich die Behandlung aus?




Reminder Pathologie

Ischämie



Ischämischer Schlaganfall

Gehirnblutung



Hämorrhagischer Schlaganfall



Akute Behandlung

- Nach der Definition kommt die Therapie immer zu spät, da selbst bei der schnellsten Behandlung Gehirngewebe zerstört wurde. → Ziel: Schaden so gering wie möglich halten.
- Ischämie
 - Rasche Wiederherstellung der Perfusion
 - Systemische Thrombolyse (Dauerinfusion einer gerinnselauflösender Substanz), lokale Lysetherapie oder Thrombektomie
- Blutung
 - Konservative oder operative Behandlung (operativ bei oberflächlichen, kleinen Blutungen)



Behandlung von Herr Koppenrath




- Diagnose: Ischämischer Schlaganfall
- Blutdruck wird nicht gesenkt (erst ab einem Wert von 200-220 mmHg würden hier Massnahmen ergriffen werden)
- Infusionstherapie mit einer kolloidalen Lösung → Verbesserung Fliesseigenschaften
- In den ersten 24 h: 2-4 l Sauerstoff pro Minute über Nasenonde
- Medikament gegen epileptische Anfälle

Fortsetzung Fallbeispiel



Was muss ich bei der akuten und subakuten
Pflege beachten?



Gruppenpuzzle



1. Findet euch in den Vorgegebenen Gruppen ein.
2. Lest den euch zugeteilten Text Vollständig durch.
3. Gestaltet 1-2 Folien zu eurem Thema für eure Mitstudierenden.
4. Schickt diese Folien an mich (ladinaw@student.ethz.ch) sowie an alle Mitglieder eurer Gruppe.
5. Findet euch nun in den Expertengruppen zusammen (Siehe Gruppeneinteilung). Nun präsentiert ihr euch in diesen Expertengruppen den Inhalt eures Textes mithilfe den von euch gestalteten Folien.

Gruppenpuzzle

Gruppeneinteilung 1 (12 Minuten)

Gruppe 1: Was tut die Pflege bei einem akuten Schlaganfall? (Text 1)	Ronja, Till, Anna
Gruppe 2: Was tut die Pflege nach der Akutphase des Schlaganfalls (Text 2)	Pratheba, Meret

Expertengruppe (8 Minuten)

Expertengruppe 1	Ronja, Till, Meret
Expertengruppe 2	Pratheba, Anna



Fachbegriffe

Begriff:	Bedeutung:
Hyperglykämie	
Dysphagie	
Parenterale Ernährung	
Hämatokrit	
Aspirationsrisiko	
Fazialisparese	




Fachbegriffe



Begriff:	Bedeutung:
Spastik	
Dekubitusprophylaxe	
Pneumonieprophylaxe	
Thromboseprophylaxe	
Obstipation	

Noch Fragen?



Ausblick auf die nächste Lektion

